


Эпизоотическая ситуация в мире по ящуру

(МЭБ, 2017 г.)



31.12.2017



Серотип вируса:

- - тип А
- - тип О
- - Азия 1
- - тип SAT-1,2,3
- - н/т

- неблагоприятные страны

- | | |
|---|---|
| 1. Алжир (тип А – 4) | 19. Малави (н/т – 1) |
| 2. Афганистан (тип А,О,Азия1 – 78) | 20. Малайзия (тип О – 17) |
| 3. Ботсвана (н/т – 1) | 21. Мозамбик (тип SAT-2 – 1
н/т – 2) |
| 4. Буркина – Фасо (н/т – 12) | 22. Монголия (тип О – 44) |
| 5. Бутан (тип А – 2
тип О – 4) | 23. Мьянма (тип О, Азия1 – 9) |
| 6. Замбия (н/т – 1) | 24. Намибия (тип SAT-2 – 6) |
| 7. Зимбабве (тип SAT-2 – 7
н/т – 46) | 25. Непал (тип А, О – 45) |
| 8. Египет (тип О, SAT-2 – 112) | 26. Нигер (н/т) |
| 9. Израиль (тип О – 2
тип А – 2) | 27. Нигерия (н/т – 3) |
| 10. Иордания (тип О – 4) | 28. ОАЭ (тип О – 2) |
| 11. Ирак (тип О – 38) | 29. Палестинская АТ (тип О – 2
н/т – 9) – эндем. |
| 12. Иран (тип А,О – 471) | 30. Россия (тип О – 5) |
| 13. Камбоджа (тип А – 49) | 31. Судан (тип О – 3) |
| 14. Кения (типы А,О,SAT-1,2 – 21) | 32. Таиланд (типы А, О – 30) |
| 15. Китай (тип О – 11
тип А – 2) | 33. Тунис (тип А – 2) |
| 16. Колумбия (тип О – 9) | 34. Турция (типы А, О – 171) – эндем. |
| 17. Конго Д.Р. (н/т – 4) | 35. ЦАР (н/т) |
| 18. Корея (тип О – 8
тип А – 1) | 36. Эритрея (н/т – 3) |
| | 37. ЮАР (тип SAT-1 – 3
тип SAT-2 – 5) |

в скобках - серотип и количество очагов

N



0 1 100 2 200 4 400 Км

